Center for Medical Diagnostic Laboratories
Faculty of Medicine Chulalongkorn University
King Chulalongkorn Memorial Hospital

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Clonality/Measurable residual disease (B-ALL / CLL / MM)

Test code	HL621
Test name	Clonality/Measurable residual disease (B-ALL / CLL / MM)
Specimen type / Container / Volume	1. เลือดครบส่วน (Whole blood) บรรจุในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA จำนวน 2 หลอด หลอดละ 3 ml 2. ไขกระดูก (Bone marrow) บรรจุในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA จำนวน 2 หลอด หลอดละ 3 ml 3. น้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid; CSF) บรรจุในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ปริมาตรอย่างน้อย 1 ml 4. น้ำวุ้นตา (Vitreous humour fluid) บรรจุในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA ปริมาตรอย่างน้อย 1 ml
Handling (การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง)	1. เลือดครบส่วน (Whole blood) และ ไขกระดูก (Bone marrow) นำส่งภายในวันที่เจาะเก็บ ในวันและเวลาราชการ หากไม่สามารถนำส่งได้ตามกำหนด ให้เก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง และนำส่งภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง 2. น้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid; CSF) และน้ำวุ้นตา (Vitreous humour fluid) ให้นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมลงเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจบนหลอดสิ่งส่งตรวจ
Patient preparation	-
Methodology	Next-Generation Sequencing (NGS)
Reference range -> Report	No evidence of clonality detected
Testing schedule	-
TAT	35 วันทำการ
Cost / CGD's coverage	13,000 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ (สิทธิ์ตามกรมบัญชีกลางเบิกได้ 13,000 บาท)
Time limit for requesting additional test	กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ส่วนงานอณูชีววิทยาขั้นสูงในโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา โทร 02-256-4000 ต่อ 80354
Storage period (ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อกำจัดทิ้ง)	1 ปี
Location,office hours and contact	อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3 โซน C ห้อง E03B05 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 80354 ผู้รับบริการภายนอกห้องรับสิ่งส่งตรวจ อาคาร อปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509
Indication (ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ)	การตรวจหาการกลายพันธุ์เพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ (B-NHL) และมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา (MM)
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)	สาร Lithium Heparin รบกวนปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลคลาดเคลื่อน
Note/Comment	-